



如您有任何疑問，請聯絡：  
New York Eye and Ear Infirmary of  
Mount Sinai  
Outpatient Pharmacy Services Department  
(門診藥房服務部)  
212-979-4380

安全提示 — 防止混淆  
外形相似發音相似  
(Look-Alike Sound-Alike)  
(形似音似·LASA)  
的眼藥水及滴耳劑



New York Eye and Ear Infirmary of  
Mount Sinai (NYEE)  
Outpatient Pharmacy (門診藥房)  
310 E. 14th Street, New York, NY 10003  
212-979-4380

# 安全提示 — 防止混淆 形似音似 (LASA) 的 眼藥水及滴耳劑

- 您知道嗎，有超過 38 種形似音似 (LASA) 的眼藥水及滴耳劑藥物對名稱與報告的用藥錯誤相關，而這都是因病人在家中錯誤服藥引起的？

## 發音相似 (Sound-Alike) 的藥物對名稱示例：

慶大黴素	(Gentamicin)
妥布黴素	(Tobramycin)
Betoptic®	Timoptic®
Ciprodex®	Tobradex®
Ocuflox®	Floxin Otic®
Cortisporin®	Neosporin®
Cosopt®	Trusopt®
Timoptic®	Viroptic®
Tobradex®	Tobrex®

- NYEE 是美國眼耳科卓越中心協會 (American Association of Eye and Ear Centers of Excellence, AAEECE) 全球應對混淆形似音似眼藥水及滴耳劑的患者安全計劃 (Worldwide Patient Safety Initiative to Address LASA Eye and Ear Medication Errors) 的參與成員。如需瞭解有關混淆形似音似 (LASA) 眼藥水及滴耳劑及我們計劃的更多資訊，請前往：  
[www.nyee.edu/lasa-e-petition.html](http://www.nyee.edu/lasa-e-petition.html)

## 10 大安全提示：防止混淆形似音似 (LASA) 藥劑

10. 要知道，市面上有些藥物名稱及產品外形相似發音相似 (Look-Alike Sound-Alike) (形似音似，LASA)，並可能導致潛在用藥錯誤。
  9. 在家中，請勿將形似音似 (LASA) 的藥物存放在一起。請存放在不同的架子或櫥櫃中。
  8. 清楚自己服用每種藥物的原因。保存一份清單。如您不確定，則請您的醫生或藥劑師代您書寫。
  7. 如您使用視覺輔具，如眼鏡或隱形眼鏡，請確保查看處方標籤或藥瓶時佩戴眼鏡，並在光線良好的房間查看。
  6. 切勿交換眼藥水及滴耳劑的彩色瓶蓋或更換製造商的藥盒，因為這可能導致用藥錯誤及嚴重的副作用。
  5. 使用眼藥水或滴耳劑時不要著急。在用藥前，回憶醫生或藥劑師對您說過什麼。如您忘記他們的指示，請再次給他們打電話。
  4. 請先洗手，再使用眼藥水或滴耳劑。
  3. 每次滴眼藥水或滴耳劑時要按照指示留出充足的時間，以便完全吸收。請勿使用超出處方指示的藥量；否則藥物將無法妥善吸收，並且您可能產生其他藥物副作用。
  2. 知道您藥物的有效期限。如處方上沒有標出有效期限，或您看不清，請讓藥劑師用大字體清晰的寫下來，以便於您查看。
  1. 扔掉所有過期藥物及根據醫生的指示您目前無需服用的藥物。這將在最大程度上降低您服用任何過期或錯誤藥物的風險。