





Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Outpatient Pharmacy Services Department (Departamento de Servicios de Farmacia Ambulatoria) de New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai al 212-979-4380



Consejos de seguridad para evitar errores en la toma de medicamentos de nombre o aspecto similar

(Look-Alike Sound-Alike, LASA) para ojos y oídos









New York Eye and Ear
Infirmary of Mount Sinai (NYEE)
Outpatient Pharmacy (Farmacia ambulatoria)
310 E. 14th Street, New York, NY 10003
212-979-4380

Consejos de seguridad para evitar errores en la toma de medicamentos LASA para ojos y oídos

- ♣ ¿Sabía que hay más de 38 pares de nombres de medicamentos LASA para ojos y oídos asociados con errores en la toma de medicamentos de los que se ha informado, originados porque los pacientes toman los medicamentos incorrectos en su casa?
- Ejemplos de pares de medicamentos con <u>nombres</u> <u>similares (Sound-Alike)</u>:

Gentamicina Tobramicina
Betoptic ® Timoptic®
Ciprodex ® Tobradex®
Ocuflox® Floxin Otic®
Cortisporin® Neosporin®
Cosopt® Trusopt®
Timoptic® Viroptic®
Tobradex® Tobrex®

NYEE es miembro participante de la Iniciativa mundial de seguridad de los pacientes para prevenir errores en la toma de medicamentos LASA para ojos y oídos (Worldwide Patient Safety Initiative to Address LASA Eye and Ear Medication Errors) de la Asociación Estadounidense de Centros de Excelencia de Ojos y Oídos (American Association of Eye and Ear Centers of Excellence, AAEECE). Para obtener más información sobre errores en la toma de medicamentos LASA para ojos y oídos y sobre nuestra Iniciativa, vaya a la siguiente dirección de Internet:

www.nyee.edu/lasa-e-petition.html

Primeros 10 puestos: Consejos de seguridad para evitar errores en la toma de medicamentos LASA

- 10. Debe saber que existen productos y nombres de medicamentos de nombre o aspecto similar (Look-Alike Sound-Alike, LASA), que pueden ocasionar errores en la toma de medicamentos.
- **9. No guarde los medicamentos LASA juntos** en su casa. Colóquelos en diferentes estantes o armarios.
- **8. Sepa por qué toma cada medicamento.** Haga una lista. Si usted no está seguro, pídale a su médico o farmacéutico que se lo anote.
- 7. Si usa ayudas visuales, comogafas o lentes de contacto, asegúrese de usarlos cuando lea la etiqueta o el frasco de su medicamento recetado en una sala bien iluminada.
- **6. Nunca cambie las tapas de colores** de sus medicamentos para ojos y oídos **ni cambie las cajas de los fabricantes**, dado que esto puede ocasionar la administración incorrecta de medicamentos y efectos secundarios graves.
- **5. Tómese su tiempo para administrar sus gotas para los ojos o para los oídos.** Recuerde las instrucciones de su médico o farmacéutico antes de tomar sus medicamentos. Si ha olvidado sus instrucciones, llámelos nuevamente.
- **4.** Lávese las manos antes y después de usar sus gotas para los ojos o para los oídos.
- 3. Espere hasta que cada gota para los ojos o para los oídos se absorba completamente, como le indicaron. No use más gotas que las indicadas en su receta; de lo contrario, las gotas no se absorberán correctamente, lo que puede provocar efectos secundarios adicionalesdel medicamento.
- **2. Sepa cuándo vence(n) su(s) medicamento(s).** Si no está en su receta o si no puede leerlo, pídale a su farmacéutico que lo anote en letras grandes para que pueda leerlo fácilmente.
- 1. Deseche TODOS los medicamentos vencidos y todos los medicamentos que NO esté tomando actualmente según las instrucciones de su médico. Esto minimizará el riesgo de tomar cualquier medicamento incorrecto o vencido.